



















Plantando confiança,
colhendo inovação.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025



FS	TRATAMENTO DE SEMENTES	Princípio ativo: Clorotalonil (42% g/L) + Tiofanato-metílico (170 g/L)
 Fungicida sistêmico e de contato com amplo espectro de ação nos alvos das culturas registradas. CULTURAS: AMENDOIM, FEIJÃO E SOJA.		
FS	TRATAMENTO DE SEMENTES	Princípio ativo: (Tiofanato-metílico (350 g/L) + Fluzianam) (82,5 g/L)
 Fungicida sistêmico e de contato com amplo espectro de ação, usado para tratamento de sementes para controle das doenças das culturas registradas. CULTURAS: ARROZ, IRRIGADO, FEIJÃO, MILHO, SOJA E TRIGO. *Restrição de uso para <i>Aspergillus flavus</i> e <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>, em feijão em dois alvos, no estado do Paraná.		
SC	ACARICIDA	Princípio ativo: Fenprolimate (50g/L)
 Acaricida/fungicida de contato, de amplo espectro de ação em vários alvos nas culturas registradas. Tem ótima ação de controle no Pulverão do Citros. Excelente alternativa de uso como um novo ativo nas culturas de algodão, amendoim, soja e feijão. CULTURAS: ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA, ALGODÃO, ALHO, AMENDOIM, ANONASIAS, AJOZE, BANANA, BATATA, BEGÔNIA, BERNHEIA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CACAU, CAFÉ, CANA-DE-ÁÇÚCAR, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, CITROS, COCO, COQUE, COQUE-FLOR, CRISANTEMO, CUCURBITÁCEAS, CUPUAÇU, DIVERSAS, ERVILHA, FEIJÃO, FEIJÃO-VAGEM, FENO, FUNGO, GERBERA, GLADIÓLO, GUARANÁ, HORTALIÇAS, JILÓ, MIM, MACÃ, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MAXIE, MELANCIA, MELÃO, MILHO, MORANGO, NECTARINA, ORNAMENTAIS, VÍDEOS DE MUDAS E ROSARIAS, PASTAÇENS, PERÍDO, PERA, PÊSSEGO, PIMENTA, PIMENTÃO, QUIABO, REPOLHO, ROÇA, ROSA, SERINGUEIRA, SOJA, TOMATE, TOMATE-RASTREIRO, TRIGO E UVA. *Restrição de uso para <i>Polyphagotarsonemus latus</i> na cultura do Citros, no estado do Paraná.		
	ADJUVANTE	Princípio ativo: N-Dodecilsulfonato de sódio
 Adjuvante para ser adicionado no preparo das calda, para melhorar e potencializar os resultados das pulverizações, reduzindo as deriva e melhorando a cobertura dos alvos. CULTURAS: ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA, ABOBRINHA, ALGODÃO, ALHO, AMENDOIM, ANONASIAS, AJOZE, BANANA, BATATA, BEGÔNIA, BERNHEIA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CACAU, CAFÉ, CANA-DE-ÁÇÚCAR, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, CITROS, COCO, COQUE, COQUE-FLOR, CRISANTEMO, CUCURBITÁCEAS, CUPUAÇU, DIVERSAS, ERVILHA, FEIJÃO, FEIJÃO-VAGEM, FENO, FUNGO, GERBERA, GLADIÓLO, GUARANÁ, HORTALIÇAS, JILÓ, MIM, MACÃ, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MAXIE, MELANCIA, MELÃO, MILHO, MORANGO, NECTARINA, ORNAMENTAIS, VÍDEOS DE MUDAS E ROSARIAS, PASTAÇENS, PERÍDO, PERA, PÊSSEGO, PIMENTA, PIMENTÃO, QUIABO, REPOLHO, ROÇA, ROSA, SERINGUEIRA, SOJA, TOMATE, TOMATE-RASTREIRO, TRIGO E UVA.		
WP	FUNGICIDA	Princípio ativo: Cimoxanil (60 g/kg) + Mancozebe (700 g/kg)
 Fungicida com ação sistêmica e protetora, indicado para o manejo da queima e míldio, nas culturas da batata, cebola, tomate e uva. CULTURAS: BATATA, CEBOLA, TOMATE E UVA.		
WG	FUNGICIDA	Princípio ativo: Clorotalonil + Tiofanato-metílico + clorotalonil (600g/kg + 240g/kg)
 Fungicida de amplo espectro que associa um ativo sistêmico (Tiofanato metílico) e outro protetor (Clorotalonil) numa formulação de fácil manuseio, para ser usado no manejo das principais doenças das culturas recomendadas. CULTURAS: AMENDOIM, CAFÉ, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PLANTAS ORNAMENTAIS, SOJA, TOMATE E UVA DE MESA. *Restrições para aplicação aérea de acordo com as legislações estaduais e municipais.		
WP	FUNGICIDA	Princípio ativo: Mancozebe (440 g/kg) + Oxidreto de cobre (500 g/kg)
 Fungicida que associa dois ativos protetores, com excelente sinergia entre eles, numa formulação estável, para ser utilizado nos manejos preventivos das principais doenças de diversas culturas. CULTURAS: ABACATE, ABÓBORA, ALHO, AMENDOIM, BANANA, BATATA, BERNHEIA, BETERRABA, BRÓCOLIS, COQUE, COQUE-FLOR, CAFÉ, CEBOLA, CENOURA, CITROS, FEIJÃO, FEIJÃO-VAGEM, FENO, MACÃ, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PERÍDO, PERA, PÊSSEGO, PIMENTA, REPOLHO, TOMATE E UVA.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Dodina (450 g/L)
 Fungicida de contato com ação específica e única, para ser usado preventivamente no manejo da sarna da madeira e da podridão parda na cultura do péssigo. CULTURAS: MACÃ E PÊSSEGO. *Produto não cadastrado no estado do Paraná.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Azoxistrobina (100 g/L) + Tetraconazol (80 g/L)
 Fungicida sistêmico com dois modos de ação, para ser usado em aplicações preventivas no manejo de doenças foliares importantes em diversas culturas. CULTURAS: ALGODÃO, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, MILHO, SOJA E TRIGO.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Clorotalonil (720 g/L)
 Fungicida protetor de amplo espectro indicado para manejos preventivos de doenças foliares, com atuação importante no controle daqueles patógenos que perdem a sensibilidade aos fungicidas específicos. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, BATATA, BERNHEIA, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, MACÃ, MAMÃO, MELANCIA, MILHO, PERÍDO, ROSA, SOJA, TOMATE E UVA.		
WG	FUNGICIDA	Princípio ativo: Fluinafol (800g/L)
 Fungicida sistêmico do grupo químico triazol, usado em aplicações via solo para o controle da ferrugem na cultura de café. CULTURA: CAFÉ.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Clorotalonil + Tebuconazol (50g/L + 50g/L)
 Fungicida com ação sistêmica e protetora, indicado no manejo preventivo e sustentável de diversas doenças importantes, inclusive para as provocadas por patógenos que desenvolveram resistência aos fungicidas específicos pois já contém multissítio na composição, seletivo, com formulação líquida que facilita o manuseio. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, AVEIA, CAFÉ, CENTEIO, CENOURA, FEIJÃO, MACÃ, MILHO, SOJA, TRIGO E TRITICALE.		
WP	FUNGICIDA	Princípio ativo: Tiofanato metílico (700 g/L)
 Fungicida sistêmico com ação curativa, indicado em aplicações preventivas no manejo de diversas doenças das culturas registradas, sem causar estresse às plantas, qualquer que seja o momento da aplicação. CULTURAS: FOLIA: ABACAXI, ABÓBORA, ALHO, ANTURIO, BANANA, BEGÔNIA, BERNHEIA, CAFÉ, CEBOLA, CITROS, CRAVO, CRISANTEMO, ERVILHA, FEIJÃO, GLADIÓLO, HORTÊNSIA, MACÃ, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ORGÂNICOS, MORANGO, PERÍDO, ROSA, SERINGUEIRA, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA, TS EM FEIJÃO E BATATA. *Restrição para abacaxi, cebola, mamão, e permanecendo com restrições para as culturas da berinjela, café, ervilha, maçã, tomate, e alguns <i>Cercospora kikuchi</i> e <i>Microspheera diffusa</i> em soja, no estado do Paraná.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Trifluzinazol (240 g/L)
 Fungicida sistêmico de translocação lenta, com propriedades preventivas e curativas, específico para controle de <i>Rhizoctonia</i>, agindo em diversas raças do fungo, proporcionando controle da doença. CULTURA: BATATA, CAFÉ, CRISANTEMO, GRAMA E GRAMADO. *Restrição de uso para a cultura do café, no estado do Paraná.		
WG	FUNGICIDA	Princípio ativo: Boscalida 500 g/kg
 Fungicida sistêmico, amplamente recomendado para o controle de doenças importantes do café e HF. CULTURAS: ACEDIA, ACEROLA, ALGODO, ALHO, ALMEIRÃO, AMORA, BATATA, BERNHEIA, CAFÉ, CEBOLA, CENOURA, CHICÓRIA, CRISANTEMO, ESPINAFRE, FEIJÃO, FRAMBUESA, JILÓ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, MOSTARDA, PIMENTA, PIMENTÃO, QUIABO, ROSA, SERINGUEIRA E TOMATE.		
WG	FUNGICIDA	Princípio ativo: Tiofanato metílico (850 g/kg)
 Fungicida sistêmico com ação preventiva, em formulação única de alta concentração, para maior rendimento por hectare, indicado para controle de diversas doenças, sem causar estresse às culturas indicadas, qualquer que seja o momento da aplicação. CULTURAS: ABACATE, ABACAXI, AVEIA, CACAU, CAFÉ, CENTEIO, CENOURA, CITROS, CUPUAÇU, FEIJÃO, GUARANÁ, KIWI, MACÃ, MAMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MILHO, SOJA, SORGO, TOMATE, TRIGO, TRITICALE E UVA.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Tiofanato metílico (500 g/L)
 Fungicida sistêmico com ação preventiva, em formulação líquida de fácil manuseio, indicado para controle de diversas doenças, sem causar estresse às culturas indicadas, qualquer que seja o momento da aplicação. CULTURAS: ALGODÃO, BANANA, CITROS, ERVILHA, FEIJÃO, MACÃ, MANGA, MELÃO, MORANGO, PRINHO MANSO, ROSA, SOJA, TOMATE E TRIGO. TS EM ALGODÃO E SOJA. *Restrição de uso para <i>Ascochyta blight</i>, <i>Ascochyta pinodes</i> e <i>Erysiphe polygoni</i> em ervilha, melão, morango, tomate, <i>Erysiphe polygoni</i> em feijão, <i>Citrosporum carposiphum</i>, <i>Schizothryum pomii</i>, <i>Venturia inaequalis</i> e <i>Neovectaria galega</i> em maçã, no estado do Paraná.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Azoxistrobina + Difenoconazole (300g/L + 200g/L)
 Fungicida sistêmico de ação preventiva e curativa, em formulação líquida de fácil manuseio e elevada concentração para maior rendimento por hectare. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, ARROZ, IRRIGADO, AVEIA, BATATA, BERNHEIA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CITROS, FEIJÃO, GRASSOL, GOIABA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, MILHO, MORANGO, PERÍDO, PIMENTÃO, TOMATE, TRIGO E SOJA. *Restrição para o alvo <i>Phakopsora pachyrhizi</i> em soja, no estado do Paraná.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Azoxistrobina (200 g/L) + TEBUCONAZOL (300 g/L)
 Fungicida Sistêmico, amplamente recomendado para o controle de doenças da parte aérea das culturas do café, milho, soja e trigo. CULTURA: CAFÉ, MILHO, SOJA E TRIGO.		
SC	FUNGICIDA	Princípio ativo: Clorotalonil (575 g/L) + Cimoxanil (50 g/L)
 Fungicida com ação protetora e sistêmica prolongada, indicado para aplicações preventivas no manejo da queima e míldio, sem causar estresse às culturas registradas. Desenvolvido em formulação líquida, de fácil manuseio, em concentração equilibrada dos ingredientes ativos. CULTURAS: BATATA, TOMATE E UVA.		
WG	FUNGICIDA	Princípio ativo: Clorotalonil (750 g/kg) + Cimoxanil (100 g/kg)
 Fungicida com ação protetora e sistêmica prolongada, indicado para aplicações preventivas no manejo da queima e míldio, sem causar estresse às culturas registradas. Desenvolvido em formulação sólida de alta concentração, para maior rendimento por hectare. CULTURAS: BATATA, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO, TOMATE E UVA.		
SL	HERBICIDA	Princípio ativo: MSMa (720 g/L)
 Herbicida sistêmico de ação total e não seletiva, indicado para manejo em pós-emergência de plantas daninhas nas culturas registradas. CULTURAS: ALGODÃO, CANA-DE-ÁÇÚCAR E CITROS.		
SC	HERBICIDA	Princípio ativo: Terbutolazina (500 g/L)
 Herbicida de ação pré-emergente e pós-emergente para a cultura do milho e sorgo, com excelente controle sobre plantas daninhas de folhas largas e boa supressão de gramíneas. CULTURAS: MILHO E SORGO.		
EC	HERBICIDA	Princípio ativo: Pirafent-Etilico (25 g/L)
 Herbicida de contato desfolhante, que inibe a atividade enzimática nos cloroplastos sob a presença de luz, que resulta na destruição da membrana celular com consequente necrose dos tecidos. CULTURAS: ALGODÃO, BATATA E FEIJÃO.		
SC	HERBICIDA	Princípio ativo: Sulfentrazone (500 g/L)
 Herbicida sistêmico com longo período residual, indicado para manejos em pré-emergência para amplo espectro de plantas daninhas (gramíneas ou folhas largas) nas culturas registradas. CULTURAS: ABACAXI, CANA-DE-ÁÇÚCAR, CAFÉ, CITROS, FUMO E SOJA. *Restrição de uso para <i>Commelina benghalensis</i> em soja, no estado do Paraná.		
SC	HERBICIDA	Princípio ativo: Ametrina (480 g/L) + Flumioxazina (40 g/L)
 Herbicida sistêmico composto por dois ativos que se complementam numa sinergia perfeita. Indicado no manejo de um amplo espectro de plantas daninhas, inclusive aquelas de difícil controle. Sua versatilidade em sistemas de aplicação garante o uso em cana-planta e cana-soca nas épocas úmidas, semi úmidas e semi secas. CULTURAS: CANA-DE-ÁÇÚCAR.		
SC	HERBICIDA	Princípio ativo: Mesotrione (480g/L)
 Herbicida seletivo, de ação sistêmica, recomendado para controle na pós-emergência das plantas infestantes nas culturas registradas, com amplo espectro de controle em daninhas folhas largas e estreitas. CULTURAS: CANA-DE-ÁÇÚCAR E MILHO.		
SC	HERBICIDA	Princípio ativo: Ametrina (500 g/L)
 Herbicida sistêmico indicado para aplicações em pré-emergência ou pós-emergência inicial no manejo de amplo espectro de plantas daninhas na cultura da cana-de-áçúcar, com seletividade para cultura, mesmo em aplicações em pós-emergência. CULTURAS: CANA-DE-ÁÇÚCAR. *Restrição de uso para <i>Amaranthus viridis</i>, <i>Emilia zanthifolia</i>, <i>Commelina benghalensis</i>, <i>(gomoze nil</i>, <i>Sida cordifolia</i> e <i>Bidens pilosa</i>, no estado do Paraná.		
CS	HERBICIDA	Princípio ativo: Clomazona (360 g/L)
 Herbicida seletivo e sistêmico para pré-emergência, recomendado para o controle de plantas infestantes nas culturas do algodão, arroz, arroz-irrigado, batata, cana-de-áçúcar, eucalipto, fumo e mandioca. CULTURAS: ALGODÃO, ARROZ, ARROZ-IRRIGADO, BATATA, CANA-DE-ÁÇÚCAR, EUCALIPTO, FUNGO E MANDIOCA. *Restrição de uso para <i>Aeschynomene rudis</i>, <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa colona</i> em arroz irrigado e <i>Spermatocoe latifolia</i> em eucalipto, no estado do Paraná.		
WP	INSETICIDA	Princípio ativo: Buprofezina (600 g/kg)
 Único inseticida com mecanismo de ação (IGR) indicado no manejo de pragas sugadoras como a mosca-branca e as cochonilhas, por isso se torna muito importante na rotação com outros inseticidas para impedir ou retardar o surgimento de indivíduos resistentes. Age por contato sobre as várias fases do ciclo da praga, reduzindo rapidamente as futuras gerações e seus danos. Sua ação de vapor é um atributo importante, principalmente para o controle daquelas pragas alojadas na face inferior das folhas. CULTURAS: ALGODÃO, CITROS, FEIJÃO, SOJA, TOMATE E OUTRAS 25 CULTURAS.		
SP	INSETICIDA	Princípio ativo: Acefato (920 g/kg)
 Inseticida sistêmico de amplo espectro que age por contato e ingestão no controle das principais pragas das culturas registradas. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CITROS, FEIJÃO, MILHO, MELÃO, SOJA E TOMATE INDUSTRIAL.		
SL	INSETICIDA	Princípio ativo: Metilol (210 g/L)
 Inseticida sistêmico de amplo espectro que age por contato e ingestão no controle das principais pragas das culturas registradas. CULTURAS: ALGODÃO, BATATA, BRÓCOLIS, COQUE, REPOLHO, MILHO, SOJA, TOMATE E TRIGO. *Restrição para <i>Rhopalosiphum graminum</i> na cultura do trigo, no estado do Paraná.		
SC	INSETICIDA	Princípio ativo: Buprofezina (250 g/L)
 Inseticida fisiológico regulador de crescimento de insetos que atua por contato, principalmente sobre as ninfas através da inibição da formação de quitina, provocando a morte do inseto quando ocorre a ecdisse ou troca de pele. CULTURAS: ALGODÃO, CITROS, FEIJÃO, MILHO, SOJA, TOMATE E MAIS 27 OUTRAS CULTURAS.		
EW	INSETICIDA	Princípio ativo: Tolfenpirade (700 g/L)
 Inseticida e acaricida, com modo de ação invasor. Age no controle de diversas pragas como a traça-do-tomateiro, traça-das-crucíferas e acaro-rajado. Possui ação larvicida e ovicida, além de reduzir a fertilidade dos insetos adultos. Possui duração de três dias na cultura de tomate, flexibilizando a colheita. CULTURAS: AVEIA, BRÓCOLIS, CENTEIO, CENOURA, COQUE, COQUE-CHINESE, COQUE-DE-BRUXELAS, COQUE-FLOR, REPOLHO, TOMATE, TRIGO E TRITICALE.		
EC	INSETICIDA	Princípio ativo: Tolfenpirade (150 g/L)
 Inseticida, Acaricida e Fungicida de contato, com modo de ação diferenciado e formulação adaptada para a cultura do algodoeiro e do feijão. Age no controle de diversas pragas como: acaro rajado, acaro branco, bicudo-do-algodoeiro, pulgão do algodoeiro e tripses. Age sobre todas as fases de desenvolvimento dos insetos e ácaros e também ajuda no controle da ramulária do algodão. CULTURA: ALGODÃO.		
EC	INSETICIDA	Princípio ativo: Lufenuron (60 g/L)
 Inseticida com mecanismo de ação (IGR) que age por ingestão e contato. É indicado no manejo das principais lagartas das culturas registradas. Sua especificidade garante excelente seletividade aos inimigos naturais. CULTURAS: ALGODÃO, BATATA, CANA-DE-ÁÇÚCAR, CITROS, COCO, MACÃ, MILHO, PERÍDO, PÊSSEGO, REPOLHO, SOJA, TOMATE E TRIGO.		
CS	INSETICIDA	Princípio ativo: Lambda-cyhalotrina (50 g/L)
 Inseticida piretróide com rápida ação sobre as pragas, desenvolvido em formulação microencapsulada que garante a performance e a estabilidade do produto sob condições de campo. Indicado no manejo de um amplo espectro de pragas nas culturas registradas. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, ARROZ, BATATA, CAFÉ, CEBOLA, CITROS, COQUE, FEIJÃO, FUNGO, MELÃO, MILHO, MORANGO, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA.		
SC	INSETICIDA	Princípio ativo: Flubendiamida (222 g/L)
 Inseticida específico para o manejo de lagartas, inclusive aquelas de difícil controle. Age por contato e ingestão. Interrompendo, em poucos minutos, os movimentos e a alimentação das lagartas. Sua especialidade garante excelência na seletividade aos inimigos naturais e insetos benéficos, como os polinizadores. Penetra rapidamente nas partes tratadas e não sofre ação de lavagem pelas chuvas. CULTURAS: ALGODÃO, AMENDOIM, AVEIA, CANA-DE-ÁÇÚCAR, CENTEIO, CENOURA, ERVILHA, FEIJÃO, MILHETO, MILHO, SOJA, SORGO, TOMATE, TRIGO E TRITICALE.		
SC	INSETICIDA	Princípio ativo: Etofenprox (700 g/L)
 Inseticida com amplo espectro de ação, alta seletividade, indicado para o manejo de insetos sugadores, desfolhadores e broqueadores de diversas culturas. CULTURAS: ABACAXI, ABOBRINHA, ALGODÃO, ALHO, ARROZ, AVEIA, BETERRABA, CAFÉ, CANDAIA, CEBOLA, CENOURA, CENOURA, CHUCHU, CITROS, COCO, DIÓIDE, EUCALIPTO, FEIJÃO, FUNGO, GRASSOL, GOIABA, MACÃ, MAMÃO, MANDIOCA, MARACUJINHA-SALSA, MANGA, MAXIE, MELANCIA, MILHO, NECTARINA, NESPERA, PERÍDO, PERA, PÊSSEGO, SOJA, TOMATE, TRIGO E UVA.		
WG	MATURADOR	Princípio ativo: Orthosulfamuron (510 g/kg)
 Maturador de cana com exclusiva tecnologia de formulação e baixa toxicologia, com ação rápida e eficaz na gestão da colheita de cana, associado ao incremento de ATR e TCH, sem causar danos à cultura. CULTURAS: CANA-DE-ÁÇÚCAR. *Acréscimo 0,1% de óleo mineral.		
	BIOESTIMULANTE	Princípio ativo: Extrato de Algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>), Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Octaborato de Potássio e Sulfato de Zinco
 Fertilizante mineral misto com alta concentração de extratos de algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>) e micronutrientes. Atua na fisiologia vegetal através da regulação hormonal e eliminação dos radicais livres, permitindo alívio dos estresses e promovendo maior fixação de flores e frutos/vagens.		
	BIOESTIMULANTE	Princípio ativo: Ácidos húmicos e fúlvicos de Leonardita
 Formulação inovadora, líquida e micronizada com altas concentrações de substâncias húmicas extraídas da Leonardita e pH ácido, possibilitando versatilidade nas misturas de tanque. Possui concentração de ácidos húmicos (20,5%) e ácidos fúlvicos (4,5%). Aumenta CTC do solo, libera o fósforo retido e promove maior desenvolvimento radicular.		
	BIOESTIMULANTE	Princípio ativo: Fosfato de potássio
 Fertilizante mineral simples, com alta concentração de fosfato de potássio e pH tamponado, induz a resistência natural das plantas, promovendo a síntese de fitoalexinas (metabólitos secundários com propriedades de defesa contra microrganismos) e lignificação dos tecidos vegetais.		
	BIOESTIMULANTE	Princípio ativo: Aminoácidos livres
Fertilizante organomineral com alta concentração de aminoácidos livres (10% p/p). Atua diretamente na fisiologia da planta, ativando os processos de assimilação do nitrogênio, protegendo a fotossíntese e promovendo maior enchimento de grãos. Possui elevada capacidade de absorção e translocação pelos vasos condutores das plantas.		